

- [5] 赵丽妮. 血管内皮生长因子对血肿瘤屏障通透性的影响及作用机制初探. 沈阳: 中国医科大学, 2009
- [6] 焦军全. 胃癌中医证型与外周血 VEGF 及 HER2 基因表达水平的相关性研究. 福州: 福建中医药大学, 2012
- [7] 李国威. 胃癌中医证型与 P53、VEGF 表达水平相关性研究. 咸阳: 陕西中医学院, 2013
- [8] 闫毓秀, 张淑萍, 滑静. p53 基因研究进展. 北京农学院学报, 2009, 24(2): 74
- [9] 钟山, 余英豪. 胃癌 HER-2 基因检测方法及其靶向治疗的研究现状. 世界华人消化杂志, 2010, 18(26): 2785
- [10] 王仰坤, 高春芳, 负田, 等. HER2 和 EGFR 基因在胃癌组织中的状态及其与临床病理的关系. 世界华人消化杂志, 2010, 18(25): 2642
- [11] 潘卫新. 胃癌癌前病变中医病证与 TFF1、EGFR 表达相关性研究. 扬州: 扬州大学, 2009
- [12] 施俊, 陆烨, 张璇, 等. 胃癌证型与雌激素和孕激素受体蛋白表

达的关系. 中西医结合学报, 2010, 8(7): 629

- [13] 田君才, 张莉, 焦丹, 等. 胃癌常见中医证型与 CDX2、LN-R 和 MMP-9 阳性表达的相关性研究. 当代医学, 2010, 16(9): 1
- [14] 陈斌, 曾志荣, 柯斌, 等. TGFβ1-509C/T 基因多态性与不同中医证型胃癌关系的研究. 广州中医药大学学报, 2011, 28(4): 339
- [15] 张晶, 付伟, 汪龙德. CDX2 基因在胃癌癌前病变不同中医证型中的表达. 中国中医药信息杂志, 2012, 19(7): 18
- [16] 张淑贞. 胃癌患者 CYP3A4 基因多态性与紫杉醇敏感性和中医证型的关联性研究. 福州: 福建中医药大学, 2013

第一作者: 任玲(1991-), 女, 硕士研究生, 研究方向: 中西医肿瘤内科临床。

通讯作者: 徐力, 13913887528@163.com

收稿日期: 2014-04-21

编辑: 傅如海

针刺治疗中风后偏盲验案 1 则

温晓妮

(山东中医药大学针推学院, 山东济南 250014)

指导: 葛宝和

关键词 中风后遗症 偏盲 针刺疗法 验案

中图分类号 R277.733.05

文献标识码 A

文章编号 1672-397X(2014)07-0081-01

笔者在老师指导下运用针刺治验中风后偏盲 1 例, 现报告如下。

1 病历摘要

马某, 男, 50 岁。2013 年 12 月 29 日初诊。

于 2013 年 9 月突发脑梗死, 经治疗好转后出现左眼外向视野偏盲 3 月余。曾静注疏通血管的药物及口服中药, 未见好转, 寻求针灸治疗。现症见: 左眼外向视野偏盲, 视物模糊, 偶有头晕无头痛, 无恶心呕吐, 左手指及左下肢麻木, 跛行步态, 纳眠可, 二便调。左上肢肌力 4 级, 伸舌右偏, 舌红, 苔黄腻, 脉沉细。诊断: 偏盲。治则: 益气活血, 化瘀通络。治疗: 针刺百会、四白、太阳、睛明、合谷、光明、三阴交、太溪、照海、太冲, 双侧太阳与睛明穴接电针, 连续波, 每日 1 次, 每次 30min。嘱患者饮食清淡, 注意休息, 进行功能训练。

患者于当日针后即感觉眼睛视物明亮清晰, 但次日起床后偏盲症状又现。连续针治 1 周后, 感觉左眼视物范围有所扩大, 视物清晰, 但疗效不稳定, 易反复。老师建议患者加用营养脑细胞的药物配合治疗。继续治疗 2 周后左眼视物范围基本恢复, 视物清晰明亮。

2 讨论

治疗本例所用穴位, 百会穴为百脉之会, 为各经脉气会聚之处, 穴性属阳, 但阳中寓阴, 能通达阴阳脉络, 连贯周身经穴; 四白、太阳、睛明穴为眼周局部取穴, 可以改善眼部周围血液循环, 治疗目疾; 合谷穴为大肠经的原穴, “面口合谷收”, 对面部五官疾病有很好的功效, 与眼周穴配合使用可治疗眼疾; 光明穴为足少阳络穴, 可疏肝明目, 通经活络; 三阴交为三阴经交会穴, 针之可滋补三阴, 健脾益血, 调补肝肾, 以达到治本目的; 太溪穴为肾经的俞穴、原穴, 与照海穴相配可滋阴益肾, 肾精充足则双目得养; 太冲穴为肝经原穴, 可平肝熄风, 疏肝养血, 肝开窍于目, 肝血充则目得濡养。本案远近取穴, 诸穴共奏调神导气、滋补三阴、通关利窍、疏通经络之功, 故可治疗脑梗死后偏盲症, 改善视力。

第一作者: 温晓妮(1989-), 女, 硕士研究生, 针灸推拿学专业。1145908405@qq.com

收稿日期: 2014-02-11

编辑: 华 由 王沁凯