徐兆山效方治验——参朴二术汤

徐兆山

(盐城市中医院, 江苏盐城 224001)

◎ 江苏省名中医 徐兆山

徐兆山,男,1965年2月生,江苏盐城人。主任中医师,南京中医药大学教授、硕士研究生导师。江苏省名中医,盐城市有突出贡献的中青年专家。现任南京中医药大学附属盐城市中医院脾胃病科主任,江苏省中医临床重点专科学科带头人,九三学社盐城市委员会委员,盐城市政协常委。兼任中国民族医药学会脾胃病分会常务委员,中国中西医结合学会消化病分会急性胰腺炎专家委员会常务委员,中国医师协会中西医结合医师分会消化病学专家委员会委员,江苏省中医药学会常务理事、脾胃病专业委员会常务委员,盐城市中医药学会脾胃病专业委员会主任委员,盐城市中西医结合学会消化病专业委员会主任委员。

1985年7月南京中医学院本科毕业,1990年7月获医学硕士学位,师从吴贻谷教授。

最擅长治疗的疾病:消化系统疾病。

最擅长使用的经典方:参苓白术散、柴胡疏肝散、乌梅丸、温胆汤、半夏泻心汤、痛泻要方。

最擅长使用的中药:党参、茯苓、薏苡仁、芍药、白术、陈皮、柴胡、厚朴、黄连、黄芩、瓦楞子、乌梅、黄芪、附子、半夏。

最推崇的古代中医药学家:张仲景、孙思邈、李东垣、朱丹溪、李时珍、张景岳、叶天士。

最喜爱的中医药典籍:《黄帝内经》《伤寒论》《金匱要略》《千金方》《诸病源候论》《脾胃论》《本草纲目》《临证指南医案》《医学衷中参西录》。

从医格言:医非博不能通,非通不能精,非精不能专。必精而专,始能由博而约。

关键词 功能性消化不良;慢性胃炎;参朴二术汤;验方;名医经验;徐兆山;江苏

1 参朴二术汤

组成:党参10g,莱菔子30g,枳实10g,白术10g,紫苏梗15g,厚朴10g,莪术10g,石见穿15g,徐长卿10g,鸡内金10g,白芍15g,炙甘草6g。

功效:健脾行气,除满消胀,开胃化食,散结止痛。

主治:功能性消化不良、慢性胃炎(脾虚不运、气滞血瘀证)。

用法:每日1剂,加水适量,浸泡1h,头煎20min,二煎30min,两煎各取250mL左右煎液混匀,分2次于早晚饭前1h温服。

方解:方中党参、莱菔子、枳实、白术健脾助运、行气除满消胀;紫苏梗、厚朴一升一降,加强行气消胀之功;顽胀日久,久病入络,加之气虚血行不畅,必有气血瘀滞,莪术行气活血、消积止痛,胃脘胀痛,因胀碍食,胀痛交作,用之每有效验;石见穿有开胃消食之功;徐长卿长于止痛,气味芳香,行气开胃,与鸡内金同用,开胃化食、散结导滞,能明显增加食欲;白芍、甘草柔肝缓急,补土泻木,既能加强疏肝作用,又能防止理气药之燥性。诸药合用,通补兼施、气血兼顾、升降同调,实为治疗胃脘顽胀的良方。

加减:脾虚明显者加当归10g、黄芪15g、茯苓10g;夹有湿热者加瓜蒌皮10g、浙贝母10g、蒲公英15g;偏虚寒者加香附10g、乌药10g、白芷15g;脾肾阳虚、腹中发冷、大便稀溏者,加肉桂6g、附片10g、艾叶10g,减莱菔子为10g;失眠者加黄柏10g、肉桂5g、远志10g、合欢皮15g;大便干结者加生大黄6g、槟榔10g、桃仁10g、火麻仁10g;气郁明显者加佛手10g、浮小麦30g、煅牡蛎30g、青皮10g。

2 验案举隅

王某,女,63岁。初诊日期:2017年4月6日。

主诉:反复胃脘部胀满10余年,加重1月余。患者10余年来为胃疾所苦,胃脘部胀满反复发作,每2~3年做1次胃镜检查,均提示为慢性非萎缩性胃炎,幽门螺杆菌(Hp)阴性,腹部B超无异常。1个月前因情绪影响,胃脘部胀满再作,至他院再查胃镜示慢性非萎缩性胃炎伴轻度胆汁反流,予莫沙必利、雷贝拉唑、铝碳酸镁,效欠佳。刻下:胃脘部胀满明显,伴有暖气反酸,纳减,食后症状加重,大便量少,1~2日一行,矢气多,形瘦,夜眠欠佳,多梦,舌淡红而暗,舌下脉络紫而粗,苔白微腻,脉弦细。西医诊断:慢性胃炎;中医诊断:胃痞(脾虚气滞夹瘀)。治以健脾行气、除满消胀,

兼以活血化瘀。予参朴二术汤加减。处方:

党参10g,莱菔子30g,枳实10g,白术10g,紫苏梗15g,厚朴10g,莪术10g,石见穿15g,鸡内金10g,远志10g,合欢皮15g,槟榔10g,桃仁10g,白芍15g,炙甘草6g。10剂。每日1剂,水煎,分早晚2次服。

2017年4月18日二诊:诉胃脘部胀满减轻,暖气仍作,无反酸,纳谷增加,大便日行1次,矢气减少,夜眠一般。舌淡红而暗,舌下脉络紫而粗,苔白微腻,脉弦细。前方去远志、槟榔,加法半夏10g、炒麦芽10g,10剂。

2017年4月30日三诊:患者胃脘胀满明显减轻,精神好转,暖气少作,无反酸,纳谷可,大便正常,夜眠一般。舌淡红,舌下脉络粗紫现象好转,苔薄白,脉弦细。二诊方去法半夏,莱菔子减为10g,加陈皮6g,10剂。

2017年5月16日四诊:患者精神可,胃脘无胀满,食纳正常,偶有暖气,无反酸,大便正常,夜眠一般,舌淡红,舌下脉络稍瘀滞,苔薄白,脉弦细。三诊方继用5剂,并以三七粉冲服舒胃丸巩固1个月,嘱调畅情志、饮食有节。

按语:胃痞病名首见于《伤寒论》,云“满而不痛者”曰痞,又具体描述为心下痞、心下痞硬、心下痞而满,故可认为胃痞的病位在心下胃脘。临床常见胃痞主分实痞与虚痞:实痞多因饮食内伤、痰浊湿热、情志失调,导致湿热痞、气痞等证,乃用清热化湿、疏肝理气、和胃消痞之法;虚痞多因久病缠绵,脾胃虚弱,中焦运化失司,乃发痞满,法宗虚则补之,补益脾胃、健运中焦。临床治痞宜先辨痞之虚实寒热,再立法选方,以恢复脾胃升降之功能,调畅中焦气机运行,消痞除满。

本案患者胃脘胀满10余年,形瘦纳少、舌淡苔薄腻,以脾虚失于运化、气机阻滞为主,久病入络,舌下脉络紫而粗,脉弦而细,乃气滞血瘀之征。方选参朴二术汤加远志、合欢皮改善睡眠,加槟榔、桃仁活血消导,助大便下行。二诊患者睡眠改善,大便自行,故去远志、槟榔,减少攻伐,加法半夏、炒麦芽,化湿助运。三诊时患者胃纳好转,苔腻不显,故去法半夏,减莱菔子用量,加陈皮疏肝和胃。四诊时患者一般情况明显好转,考虑患者病程较长,故在前方巩固的基础上,以三七粉活血化瘀、舒胃丸善后以图久效。

收稿日期:2020-10-22

编辑:吴宁